

# Aussaatinformation - Sonstige Futterpflanz

| Pflanzenart                                   | Anbau, Nutzung | Keimfähige Körner / m <sup>2</sup> | Anzustrebende Pflanzenzahl bei Ernte pro m <sup>2</sup> , | Tausendkorngewicht (g) | Saatmenge bei Reinsaat (kg/ha) | Reihenweite (cm) | Ablage in der Reihe (cm) bei Einzelkornsaat bzw. Pflanzuna | Saattiefe (cm) | Saatzeiten (Datum) |
|---|----------------|------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------|--|----------------|--------------------|
| <b>Kohlrübe (direkt gesät)</b>                | H; F           | 20-25                              | 7-8   | 2,5-3,5                | 2-3                            | 40-60            | 9-10   | 1-3            | 15.3.-20.4.        |
| <b>Kohlrübe (gepflanzt)</b>                   | Zwe; F         | -                                  | 5-7   | 2,5-3,5                | 0,8-1,0                        | 40-60            | 25-35  | -              | 30.5.-10.6.        |
| <b>Futterkohl, Markstammkohl</b>              | H; F           | 35-55                              | 25-50   | 3,5-4,5                | 2,5-3,0                        | 30-50            | -  | 1-2            | 20.3.-15.4.        |
|   | Zwe; F         | 35-55                              | 25-50   | 3,5-4,5                | 2,5-3,0                        | 30-50            | -  | 1-2            | 1.5.-15.6.         |
|   | Soz; F         | 35-55                              | 25-50   | 3,5-4,5                | 2,5-3,0                        | 30-50            | -  | 1-2            | 25.6.-5.8.         |
| <b>Markstammkohl (gepflanzt)</b>              | Zwe, Soz; F    | -                                  | 7-10  | -                      | 1,0                            | 40-50            | 30   | -              | 1.6.-5.8.          |
| <b>Phazelle</b>                               | H; Kö          | 300-500                            | 200-350   | 1,7-3,0                | 8-12                           | 10-15            | -  | 1-1,5          | 25.3.-20.4.        |
|   | Soz; F, Gd     | 300-500                            | 200-350   | 1,7-3,0                | 8-12                           | 10-15            | -  | 1-1,5          | 15.7.-31.8.        |
| <b>Ölrettich</b>                              | Samen          | ca. 80                             | ca. 60  | 9-15                   | 7-11                           | 10-30            | -  | 2-3            | 20.3.-15.4.        |
|   | H; F           | 150-200                            | 100-150   | 9-15                   | 15-30                          | 10-30            | -  | 2-3            | 20.3.-15.4.        |
|   | Soz; F, Gd     | 150-200                            | 100-150   | 9-15                   | 15-30                          | 10-30            | -  | 2-3            | 25.6.-5.9.         |
| <b>Futtermöhre</b>                            | H; F, Gd       | 100-130                            | 80-100  | 1,8-2,5                | 2-3                            | 25-42            | 4-7  | 1-2            | 15.3.-5.4.         |
| <b>Futtermöhre (abgerieben: TKG 1,0-1,4g)</b> | Zwe; F         | 100-130                            | 80-100  | 1,8-2,5                | 2-3                            | 25-42            | 4-7  | 1-2            | 1.5.-31.5.         |
| <b>Stoppelrübe</b>                            | Soz; F         | 40-50                              | 25-40   | 2,0-3,0                | 1-1,5                          | 25-42            | 25-40  | 1-2            | 25.6.-15.8.        |

## Zeichenerklärung

H = Hauptfrucht

Zwe = Zweitfrucht

Wiz = Winterzwischenfrucht

Soz = Sommerzwischenfrucht

Bs = Blanksaat

Us = Untersaat

Kö = Körnernutzung

F = Futternutzung

CCM = Corn-Cob-Mix

GPS = Ganzpflanzensilage zur Verfütterung oder Energienutzung

Samen = Samenbau

Gd = Gründüngung, Brache

