


Aussaatinformation - Mittel- und Großsamige Leguminosen

 Pflanzenart	Anbau, Nutzung	Keimfähige Körner / m ²	Anzustrebende Pflanzenzahl bei Ernte pro m ² , Bestandesdichte	Tausendkorngewicht (g)	Saatmenge bei Reinsaat (kg/ha)	Reihenweite (cm)	Ablage in der Reihe (cm) bei Einzelkornsaat bzw. Pflanzung	Saattiefe (cm)	Saatzeiten (Datum)
Ackerbohne (Drillsaat)	Kö	50-60	40-50	350-580	180-300	20-30	-	6-10	25.2.-31.3.
Ackerbohne (Einzelkornsaat)	Kö	40-45	35-40	350-580	15-250	35-42	5-9	6-10	25.2.-31.3.
Ackerbohne (Drillsaat)	Soz, F; Gd	40-45	35-40	350-580	150-270	20-30	-	6-10	25.6.-5.8.
Körnererbse	Kö	70-100	60-85	170-320	170-280	10-30	-	4-6	1.3.-15.4.
	Soz;Gd	80-110	70-95	170-320	190-300	10-30	-	4-6	25.6.-25.8.
Futtererbse	H;F, Kö	70-100	60-85	120-220	110-170	10-30	-	3-6	1.3.-15.4.
	Soz; F, Gd	80-110	70-95	120-220	120-170	10-30	-	3-6	25.6.-15.8.
Sojabohne (0, 00; Drillsaat)	Kö	50-80	40-60	120-250	70-130	20-30	-	3-4	15.4.-5.5.
Sojabohne (000; Drillsaat)	Kö	70-90	50-75	120-250	90-150	20-30	-	3-4	15.4.-5.5.
Sojabohne (Einzelkornsaat)	Kö	60-85	50-75	120-250	80-140	30-50		3-4	15.4.-5.5.
Weißer Lupine	Kö	65-85	55-70	250-450	170-250	10-30	3-5	3-4	15.3.-15.4.
Blaue Lupine	Kö	70-140	60-120	150-200	110-230	10-30	-	3-4	10.3.-15.4.
	H; F	85-140	70-120	150-200	120-230	10-30	-	2-4	10.3.-20.4.
	Soz; F, Gd	85-140	70-120	150-200	120-230	10-30	-	2-4	1.7.-5.8.

 Pflanzenart	Anbau, Nutzung	Keimfähige Körner / m ²	Anzustrebende Pflanzenzahl bei Ernte pro m ² ,	Tausendkorngewicht (g)	Saatmenge bei Reinsaat (kg/ha)	Reihenweite (cm)	Ablage in der Reihe (cm) bei Einzelkornsaat bzw. Pflanzung	Saattiefe (cm)	Saatzeiten (Datum)
	Soz; F, Gd	85-100	70-90	100-160	100-140	10-30	-	2-4	1.7.-5.8.
	H;F	85-100	70-90	100-160	100-140	10-30	-	2-4	1.4.-30.4.
	Zwe; F	85-100	70-90	100-160	100-140	10-30	-	2-4	1.5.-31.5.
Saatwicke	H; F	150-200	130-170	40-70	70-140	20-30	-	3-5	1.3.-15.4.
	Soz; F Gd	150-200	130-170	40-70	70-140	20-30	-	3-5	25.6.-5.8.
	H; Kö	130-160	110-140	40-70	60-120	20-30	-	3-5	1.3.-15.4.
Zottelwicke	H; Kö	130-160	110-140	25-40	40-60	20-30	-	2-5	15.8.-15.9.
	Wiz; F, Gd	150-250	130-200	25-40	60-110	20-30	-	2-5	10.7.-15.9.
Pannonische Wicke	H; Kö	130-200	120-170	45-50	80-100	20-30	-	2-5	15.8.-10.9.
	Wiz; F, Gd	150-250	130-200	45-50	100-120	20-30	-	2-5	10.7.-15.9.
Linse	H; Kö	150-220	130-170	25-60	60-100	10-25	-	2-4	20.3.-15.4.
Platterbse	H; F	70-100	60-80	170-260	160-220	10-30	-	4-5	1.3.-15.4.
	Soz; Gd	80-110	70-100	170-260	170-230	10-30	-	4-5	25.6.-15.8.

Zeichenerklärung

H = Hauptfrucht

Zwe = Zweitfrucht

Wiz = Winterzwischenfrucht

Soz = Sommerzwischenfrucht

Bs = Blanksaat

Us = Untersaat

Kö = Körnernutzung

F = Futternutzung

CCM = Corn-Cob-Mix

GPS = Ganzpflanzensilage zur Verfütterung oder Energienutzung

Samen = Samenbau

Gd = Gründüngung, Brache

